

Zilbrysq může zvyšovat riziko meningokokové infekce. Pokud není infekce včas rozpoznána a léčena, může být i smrtelná.

Zavolejte svému ošetřujícímu lékaři nebo okamžitě vyhledejte lékařskou pohotovost, pokud se u Vás začnou projevovat kterékoli z níže uvedených známek nebo příznaků meningokokové infekce jako je:

- bolest hlavy s dalšími příznaky, jako jsou:
 - nevolnost (nauzea),
 - zvracení,
 - horečka a ztuhlost krku nebo zad,
- horečka s vyrážkou nebo bez ní,
- oči citlivé na světlo,
- zmatenost nebo ospalost.
- bolest svalů s příznaky podobnými chřipce

▲ Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací. Pokud se u Vás vyskytne jakýkoli nežadoucí účinek sdělte to svému lékaři, lékařnickovi, zdravotní sestře.

Kartu noste u sebe během léčby přípravkem ZILBRYSQ a ještě dva měsíce po jejím ukončení, protože riziko infekce přetrvává. Předložte ji každému lékaři nebo jinému zdravotnickému pracovníkovi, kterého navštívíte a lékařnickovi při vyzvednutí přípravku ZILBRYSQ.

Důležité informace o bezpečnosti pro zdravotnické pracovníky

Tomuto pacientovi byl předepsán zilukoplan, inhibitor složky 5 (C5) komplementu, který může zvyšovat náchylnost k meningokokovým infekcím způsobeným *Neisseria meningitidis*.

- **Vyšetřete neprodleně pacienta. Při podezření na meningokokovou infekci přijměte vhodná opatření, např. zahajte léčbu antibiotiky a do vyloučení meningokokové infekce přerušete podávání zilukoplanu.**
- Pokud u tohoto máte pacienta podezření na meningokokovou infekci, kontaktujte co nejdříve předepisujícího lékaře, viz kontakty níže.

Jméno a příjmení pacienta _____

Ošetřující lékař _____

Identifikační č. pacienta: _____

Tel. číslo ošetřujícího lékaře: _____

Kontaktní tel.
pro naléhavé případy: _____