

- Dieter Patient wird mit ZILBRY50 (Zilucaplan) behandelt, einem Inhibitor der Komplementkomponente 5 (C5), der die Aufälligkeit für Infektionen, die durch den Erreger *Nemisseria meningitidis* verursacht werden, erhöhen kann.
  - Menigokokken-Infektionen können rasch lebensbedrohend werden und tödlich verlaufen, wenn sie nicht frühzeitig erkannt und behandelt werden.
  - Konsultieren Sie so schnell wie möglich den Verordnenden Arzt, wenn Sie eine Meningokokken-Infektion bei diesem Patienten vermuten. Die Kontaktdaten des Verordnenden Arztes sind auf dieser Patientenkarte zur Sicherung Anwendung angegeben.

## Wichtige Informationen für medizinische Fachpersonen

# ZILBRYSO<sup>®</sup> (Zilucoplatin)

## Kontaktdaten

Name des Patienten \_\_\_\_\_

Patienten-ID \_\_\_\_\_

UCB-ZIL-LU-\_\_\_\_\_

Name des verordnenden Arztes \_\_\_\_\_

Telefonnummer des verordnenden Arztes \_\_\_\_\_

Notfall-Kontaktnummer: \_\_\_\_\_

Für weitere Informationen über ZILBRYSQ lesen Sie bitte die Fachinformation des Arzneimittels. Die Fachinformation ist online verfügbar unter: [Zilbrysq.inn-zilucoplan.europa.eu](http://Zilbrysq.inn-zilucoplan.europa.eu).



Kontaktieren Sie umgehend Ihren Arzt oder begeben Sie sich sofort in die Notaufnahme, wenn Sie eines der folgenden Anzeichen oder Symptome einer Meningokokken-Infektion bemerken:

- Kopfschmerzen, die gemeinsam mit einem dieser weiteren Symptome auftreten:
  - Übelkeit oder Erbrechen
  - steifer Nacken oder steifer Rücken
  - Fieber
- Fieber mit oder ohne Hautausschlag
- Lichtempfindliche Augen
- Verwirrtheit oder Benommenheit
- Muskelschmerzen mit grippeähnlichen Symptomen

Sie können jede Nebenwirkung, die bei Ihnen auftritt, an [www.guichet.lu/pharmacovigilance](http://www.guichet.lu/pharmacovigilance) melden. Die Meldung kann auch an UCB erfolgen: [UCBCares.lu@ucb.com](mailto:UCBCares.lu@ucb.com) oder 08002 3204 (kostenlos).

## **Patientenkarte zur sicheren Anwendung** (RMA-Version 05/2024)

▼ Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Die Behandlung mit ZILBRYSQ kann das Risiko für eine Meningokokken-Infektion erhöhen. Meningokokken-Infektionen müssen frühzeitig erkannt und behandelt werden.

**Führen Sie diese PATIENTENKARTE während der gesamten Behandlungsdauer und bis zwei Monate nach Ihrer letzten Dosis ZILBRYSQ stets mit sich.**

**Zeigen Sie diese PATIENTENKARTE dem medizinischen Fachpersonal, das an Ihrer medizinischen Versorgung beteiligt ist, bzw. bei einem Krankenhausaufenthalt und in Notfallsituationen.**

Für weitere Informationen über ZILBRYSQ lesen Sie bitte die Gebrauchsinformation.

