

Zilicoplan può aumentare la possibilità di contrarre un'infezione da meningococco. Si può trattare di un'infezione delle pareti del cervello e del midollo spinale chiamata meningite. Può anche essere un'infezione del sangue chiamata septicemia. Queste infezioni possono rapidamente mettere il paziente in pericolo di vita o diventare fatali se non riconosciute e trattate precocemente.

Chiama il Suo medico o si rivolga immediatamente al pronto soccorso se manifesta qualiasi segno o sintomo di infezione da meningococco.

Presenta in ospedale.

Mostri questa SCHEDA DI ALLEGATA PER IL PAZIENTE a tutti gli operatori sanitari coinvolti nella Sua assistenza sanitaria e se si

(zilucopлан)

SCHEDA DI ALLETTA PER IL PAZIENTE

ZILBRYSG[®]

Tenga questa Scheda di Allerta per il paziente sempre con sé.

Chiami il Suo medico o si rivolga immediatamente al Pronto Soccorso se manifesta uno qualsiasi di questi segni e sintomi di infezione da meningococco:

- Mal di testa con uno qualsiasi di questi altri sintomi:
 - nausea o vomito – rigidità del collo – rigidità della schiena – febbre
 - Febbre, con o senza eruzione cutanea
 - Sensibilità degli occhi alla luce
 - Confusione o sonnolenza
 - Dolori muscolari accompagnati da sintomi simil-influenzali

SICUREZZA.

Questo medicinale è sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permette la rapida identificazione di nuove informazioni sulla

Dose DI ZILUCOPLAH.

Tenga questa scheda SEMPRE con sé durante il trattamento e per i 2 mesi dopo l'ultima dose di zilucopлан. Il rischio di infezione da meningococco può persistere per diverse settimane dopo l'ultima

Mostri questa scheda all'operatore sanitario.

SI TI VOLGÀ AL PRONTO SOCCORSO.

Qualora non riesca a mettere in contatto con il suo medico,

Se manifesterà qualità si segno o sintomo di infezione da meningococco, contatti immediatamente il Suo medico.

Importanti informazioni sulla sicurezza per operatori sanitari

A questo paziente è stato prescritto zilucoplan, un inibitore della proteina C5 del complemento che può aumentare la suscettibilità del paziente a infezioni meningococciche causate da *Neisseria meningitidis*.

Per ulteriori informazioni su zilucoplan, si rimanda al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.

SCHEDA DI ALLERTA DEL PAZIENTE

- Le infezioni da meningococco possono rapidamente mettere il paziente in pericolo di vita o diventare fatali se non riconosciute e trattate precocemente.
- Sottoporre immediatamente il paziente a valutazione. In caso di sospetta infezione da meningococco, devono essere adottate misure adeguate come il trattamento con antibiotici e l'interruzione del trattamento con zilucoplan fino all'esclusione dell'infezione da meningococco.
- Contatti l'operatore sanitario che ha prescritto zilucoplan il prima possibile se sospetta un'infezione da meningococco in questo paziente. Il prescrittore è indicato su questa scheda di allerta per il paziente.

Contatti il prescrittore di zilucoplan riportato qui di seguito non appena possibile se il paziente presenta eventuali segni o sintomi di infezione da meningococco.

Nome del paziente: _____

Nome del prescrittore: _____

CAP ID Paziente: UCB-ZIL-IT-

Numero di telefono del prescrittore: _____

Numero di contatto in caso di emergenza: _____