

PATIËNTENWAARSCHUWINGSKAART

▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.

Laat deze PATIËNTENWAARSCHUWINGSKAART zien aan iedere arts of hulpverlener die jou onderzoekt en als je naar het ziekenhuis gaat.

Draag deze kaart altijd bij jou tijdens de behandeling en gedurende twee maanden na je laatste dosis zilucoplan. Het risico op een meningokokkeninfectie kan enkele weken na de laatste dosis zilucoplan aanhouden.

Zilucoplan kan je kans op het krijgen van een meningokokkeninfectie vergroten. Dit kan een infectie zijn van het vlies van de hersenen en het ruggenmerg, genaamd meningitis. Het kan ook een infectie zijn van het bloed, genaamd sepsis of bloedvergiftiging. Deze infecties kunnen snel levensbedreigend of dodelijk worden als ze niet vroegtijdig worden herkend en behandeld.

Bel je arts of zoek onmiddellijk spoedeisende hulp als je tekenen of symptomen van een meningokokkeninfectie hebt.

Draag deze kaart altijd bij je.

Bel je arts of zoek onmiddellijk spoedeisende hulp als je deze tekenen en symptomen van meningokokkeninfectie ervaart:

- Hoofdpijn met een of meer van deze andere symptomen:
— misselijkheid of braken — stijve nek — stijve rug — koorts
- Koorts met of zonder uitslag
- Gevoeligheid van je ogen voor licht
- Verwardheid of slaperigheid
- Spierpijn met griepachtige symptomen

Vertel het je arts meteen als je tekenen of symptomen van meningokokkeninfectie hebt.

Als je je arts niet kunt bereiken, ga naar de spoeddienst.

▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Je kan helpen bij het vaststellen van nieuwe veiligheidsinformatie door alle bijwerkingen die je krijgt, vooral meningokokkeninfectie, te melden.

Meld deze via <http://www.eenbijwerkingmelden.be> van het FAGG. Kennisgeving kan ook worden gedaan bij UCB: UCBCares.BE@ucb.com of 0800 38 008 (gratis).

PATIËNTENWAARSCHUWINGSKAART

Belangrijke veiligheidsinformatie voor artsen en hulpverleners

Aan deze patiënt is zilucoplan voorgeschreven, een complementcomponent 5 (C5) -remmer die de patiënt vatbaarder kan maken voor meningokokkeninfecties veroorzaakt door *Neisseria meningitidis*.

Raadpleeg voor meer informatie over zilucoplan het SKP.

Zorgbeoefenaars hebben toegang tot deze informatie op de website: <https://www.zilucoplanrmp.eu>.

INFORMATIEKAART VOOR DE PATIËNT

- Meningokokkeninfecties kunnen snel levensbedreigend worden en kunnen fataal zijn als ze niet snel worden gediagnosticeerd en behandeld.
- Evalueer de patiënt onmiddellijk. In geval van een vermoede meningokokkeninfectie dienen passende maatregelen te worden genomen, zoals behandeling met antibiotica en stopzetting van de behandeling met zilucoplan tot een meningokokkeninfectie kan worden uitgesloten.
- Neem bij een vermoede meningokokkeninfectie bij deze patiënt zo snel mogelijk contact op met de arts die zilucoplan heeft voorgeschreven. De voorschrijver staat vermeld op deze Informatiekaart voor de patiënt.

Neem zo snel mogelijk contact op met de vermelde voorschrijver van zilucoplan als de patiënt tekenen of symptomen van een meningokokkeninfectie vertoont.

Naam patiënt _____

Identificatienummer patiënt UCB-ZIL-BE-

Naam voorschrijver _____

Telefoonnummer voorschrijver _____

Contactnummer bij noodgevallen _____