

## CARTE D'ALERTE PATIENT

▼ Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire.

**Présentez cette CARTE D'ALERTE PATIENT à tout médecin ou soignant qui vous examine, si vous vous rendez à l'hôpital.**

**Portez toujours cette carte sur vous pendant le traitement et pendant les deux mois qui suivent la dernière dose du zilucoplan. Le risque d'infection à méningocoque peut persister quelques semaines après la dernière dose du zilucoplan.**

Le zilucoplan peut augmenter votre risque de développer une infection à méningocoque. Il peut s'agir d'une infection de la paroi du cerveau et de la moelle épinière, appelée méningite. Il peut également s'agir d'une infection du sang, appelée sepsis ou empoisonnement du sang. Ces infections peuvent rapidement mettre le pronostic vital en jeu et devenir fatales si elles ne sont pas identifiées et traitées à temps.

Appelez votre médecin ou rendez-vous immédiatement aux urgences si vous présentez des signes et symptômes d'une infection à méningocoque.

### **Portez toujours cette carte sur vous.**

**Appelez votre médecin ou rendez-vous immédiatement aux urgences si vous présentez les signes et symptômes d'une infection à méningocoque suivants:**

- Maux de tête avec un ou plusieurs des symptômes suivants:
  - nausées ou vomissements – raideur de la nuque – raideur du dos – fièvres
- Fièvre avec ou sans éruption cutanée
- Yeux sensibles à la lumière
- Confusion ou somnolence
- Douleurs musculaires accompagnées de symptômes pseudo-grippaux

**Informez immédiatement votre médecin si vous présentez des signes ou symptômes d'infection à méningocoque.**

**Si vous ne pouvez pas joindre votre médecin, rendez-vous aux urgences.**

▼ Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Vous pouvez contribuer à l'élaboration de nouvelles informations de sécurité en déclarant tous les effets indésirables que vous présentez, en particulier l'infection à méningocoque.

Déclarez ceux-ci via <http://www.notifieruneffetindesirable.be> de l'AFMPS. La déclaration peut également se faire chez UCB:  
[UCBCares.BE@ucb.com](mailto:UCBCares.BE@ucb.com) ou 0800 38 008 (gratuit).



## CARTE D'ALERTE PATIENT

### Informations importantes de sécurité pour les médecins et soignants

Le zilucoplan est prescrit à ce(tte) patient(e), un inhibiteur de la protéine C5 du complément, qui peut rendre le/la patient(e) plus sensible aux infections à méningocoque causées par *Neisseria meningitidis*.

Pour de plus amples informations, consultez le RCP du zilucoplan.

Les professionnels de santé ont accès à ces informations via le site Web:  
<https://www.zilucoplanrmp.eu>.

### CARTE D'INFORMATION PATIENT

- Les infections à méningocoques peuvent vite mettre le pronostic vital en jeu et devenir fatales si elles ne sont pas rapidement diagnostiquées et traitées.
- Évaluez immédiatement le/la patient(e). En cas de suspicion d'infection à méningocoque, les mesures appropriées doivent être prises, comme une antibiothérapie et l'arrêt du traitement par le zilucoplan jusqu'à ce qu'une infection à méningocoque puisse être exclue.
- En cas de suspicion d'infection à méningocoque chez ce(tte) patient(e), prenez immédiatement contact avec le médecin qui a prescrit le zilucoplan. Le prescripteur est mentionné sur cette carte d'information patient.

**Prenez contact aussi vite que possible avec le prescripteur cité du zilucoplan si le/la patient(e) présente des signes ou symptômes d'infection à méningocoque.**

Nom du/de la patient(e) \_\_\_\_\_

Numéro d'identification du/de la patient(e)

UCB-ZIL-BE-

Nom du prescripteur \_\_\_\_\_

Numéro de téléphone du prescripteur \_\_\_\_\_

Numéro en cas d'urgence \_\_\_\_\_